

Trẻ em từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để nhận thuốc ngừa COVID-19 hiệu Pfizer.



Đưa con quý vị đi tiêm phòng



Phụ huynh, Người giám hộ và Người chăm sóc được khuyến khích đưa những trẻ em đủ điều kiện đi tiêm phòng để hạn chế sự lây lan của COVID-19 khắp Hạt Santa Clara. Để biết danh sách các phòng khám cần lấy hẹn và phòng khám không cần hẹn, bao gồm các trường học và nhà thuốc địa phương, hãy truy cập www.sccfreevax.org.



Những gì cần mang đến cuộc hẹn

Quý vị sẽ được yêu cầu ký vào một biểu mẫu xác nhận sự hội đủ điều kiện về độ tuổi và sự đồng ý của quý vị.

Phụ huynh nên mang theo thẻ vắc xin màu vàng của con họ.

Hãy sẵn sàng hỗ trợ con quý vị trong lúc tiêm ngừa.



Giữ an toàn sau khi tiêm phòng

Điều quan trọng là phải tiếp tục đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì khoảng cách với người khác sau khi tiêm ngừa. Tiếp tục đi xét nghiệm nếu các triệu chứng xuất hiện. Tìm thông tin đi xét nghiệm tại sccfreetest.org




Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua đại dịch này!

Việc chủng ngừa cho cư dân của Hạt Santa Clara, bao gồm cả trẻ em, tạo sự phấn chấn và cho chúng ta niềm hy vọng rằng những tiến bộ đều đặn đang được thực hiện. Thông tin cập nhật về việc tiêm ngừa có thể được tìm thấy tại www.sccfreevax.org.

Stronger Together

Vắc xin rất an toàn và có hiệu quả.



Vắc xin đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn

Vắc xin đã được thử nghiệm trên hàng chục nghìn tình nguyện viên ở các độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau theo tất cả các bước trong quy trình phê duyệt.

Vắc xin COVID-19 đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn được khuyến nghị bởi các chuyên gia y tế và bác sĩ.

Việc tiêm ngừa hỗ trợ trẻ em học tập tại trường

Tiêm ngừa là chiến lược phòng ngừa hàng đầu cho sức khỏe cộng đồng để chấm dứt đại dịch COVID-19. Thúc đẩy việc tiêm ngừa có thể giúp các trường tiếp tục cho trẻ em đến học tại lớp cũng như các hoạt động ngoại khóa và thể thao.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi chủng ngừa

Trẻ em sẽ được tiêm hai liều vắc xin Pfizer, mỗi liều cách nhau 3 tuần. Thuốc chủng ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bằng một phần ba liều tiêm cho người lớn. Giống như các loại vắc xin thông thường khác, con quý vị có thể bị đau cánh tay, sốt, nhức đầu hoặc mệt mỏi sau khi tiêm vắc xin.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về vắc xin và cách lên lịch hẹn, hãy vào trang mạng www.sccfreevax.org, gọi 408-970-2000, hoặc liên lạc với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế của con quý vị.

